


Monitoring

Gebrauchsanleitung der Pheromone für die Deltafalle

Einheit: Pheromon pro Falle (1-2 Stück, schädlingsspezifisch pro Saison)



Pheromone mit 1 Stück / Saison:

- Apfelglasflügler
- Blausieb, Bodenseewickler
- Erbsenwickler
- Gemüseeule, Johannisbeerglasflügler, Kleiner Fruchtwickler, Kohlschabe/motte,
- Lauchmotte, Lederfarbener Schalenwickler,
- Pfirsichmotte

Pheromone mit 2 Stück / Saison:

- Apfelwickler, Apfelschalenwickler
- Baumwollkapseläule
- Einbindiger Traubenwickler, Bekreuzter Traubenwickler
- Fleckenminiermotte
- Gammaeule
- Kastanienminiermotte
- Kohleule
- Pfirsichwickler, Pflaumenwickler
- Saateule
- Ypsiloneule

Wirkmechanismus: Der Pheromondispenser sendet einen Lockstoff aus, der männliche Falter der jeweiligen Art anlockt. Diese bleiben auf dem Leimboden der Falle haften und geben so Aufschluss über den Befall.

Anwendung

1. Einen Handschuh anziehen, den Pheromondispenser aus dem Beutel nehmen. Der Pheromondispenser hat meistens die Form einer Kapsel.
 2. Die Kapsel direkt auf den Leimboden der Falle legen.
 3. Die Deltafalle gemäss separater Gebrauchsanleitung zusammensetzen und montieren.
- Einsatz der Falle: Kurz vor dem zu erwartenden Flugbeginn des Schädlings. In geschlossenen Bereichen unmittelbar bei der Pflanzung.
 - Die Falle mit einer Kordel in der Baumkrone in 1.5 bis 2 m Höhe aufhängen. Im Gewächshaus direkt über dem Pflanzenbestand aufhängen und an das Wachstum anpassen.
 - Den Leimboden nach 4 bis 6 Wochen austauschen (je nach Witterung). Sobald er zu schmutzig ist, wird der beleimte Boden ersetzt, da die Falter sonst nicht mehr haften bleiben.
- Lagerung: im Kühlschrank (siehe Etikette)