








Fiche technique

Lutte contre les campagnols et les rats

Aperçu des rongeurs

Taupe, taupe commune (<i>Talpa europaea</i>)	<ul style="list-style-type: none">• Longueur: 6-22 cm• Poids: 90-170 g• Tronc cylindrique• Cou très court	 
Campagnol terrestre, taupe grise (<i>Arvicola terrestris</i>)	<ul style="list-style-type: none">• Longueur: 17-22 cm• Poids: 150-300 g• Longueur de la queue: 9-14 cm• Le plus grand des campagnols	 
Campagnol des champs (<i>Microtus arvalis</i>)	<ul style="list-style-type: none">• Longueur: 9-12 cm• Poids: 18-40 g• Longueur de la queue: 3.5-3.8 cm• Ventre généralement blanc à rouge-jaune	 
Musaraigne (<i>Soricidae</i>)	<ul style="list-style-type: none">• Longueur: 6-10 cm• Poids: 10-30 g• Longueur de la queue: 3.8-5 cm• Gris foncé/gris brun	

Source images: NDR, UFA-Revue, Osthessen Zeitung, Getty/phototrip, www.saemereien.ch, www.gruss-hygiene.de, www.agrarheute.com

Au printemps, en fonction des conditions météorologiques de l'automne et de l'hiver, de nombreux agriculteurs doivent lutter contre les dégâts causés par les campagnols dans leurs champs. Outre les dégâts dans les champs, des dommages peuvent également survenir dans les maisons ou les étables. Pour prévenir de tels dégâts, il existe différentes méthodes pour lutter contre les campagnols ou les rats.

Rodenticides autorisés

Dans les champs: Cobra Forte

Actuellement, Cobra Forte est le seul produit autorisé pour lutter contre les campagnols et les taupes dans les grandes cultures, l'arboriculture, la viticulture et les cultures maraîchères. Les granulés sont déposés dans les galeries des campagnols. Ensuite, il faut

bien refermer les ouvertures, mais les galeries ne doivent pas s'effondrer. Le gaz (hydrogène phosphoré) de Cobra Forte se développe au contact de l'humidité du sol. Ce gaz se diffuse en peu de temps dans le système de galeries souterraines et provoque la mort des campagnols. Les intempéries et des conditions de sol défavorables peuvent réduire l'efficacité.



Cobra Forte (Source: Sintagro)

Pour garantir le succès du traitement, il est impératif que le sol soit suffisamment humide. La zone traitée doit être contrôlée pendant une période prolongée et, en cas de migration, un traitement supplémentaire doit être entrepris. Le produit n'est pas nocif pour les plantes cultivées. Respecter les mises en garde avant l'utilisation. Le produit ne peut être utilisé que par des personnes titulaires d'un permis professionnel pour l'emploi de produits phytosanitaires.

Utilisation / dosage:

Dans les sols légers avec une forte infestation, 3 à 5 granulés doivent être répartis sur 3 à 5 m de galeries. Dans tous les autres types de sol avec une infestation normale, 3 à 5 granulés suffisent pour 8 à 10 m de galeries.

Substance active:

56 % de phosphore d'aluminium (produit générateur de gaz).

Emballage:

- 250 g ou 1 kg
- Flacon en aluminium refermable avec bouchon à vis

À l'intérieur: Boîte à appât

Pour l'intérieur, il est judicieux d'utiliser une boîte à appât. Celle-ci est approvisionnée avec un appât et placée sur le sol dans un endroit sec. Les animaux pénètrent dans la boîte par un orifice d'entrée et y trouvent l'appât. La grande boîte à appât, appropriée pour les rats, est équipée d'une barrette pour suspendre les produits. La petite boîte à appât suffit pour les souris.

Avantages:

- Dispersion réduite des appâts
- Contrôle de la consommation
- Protection contre l'humidité et la lumière
- Inaccessible pour les autres animaux



Boîte à appât pour les souris Sintagro (Source: Sintagro)

Boîte à appât pour les rats Sintagro (Source: Sintagro)

La boîte à appât peut être utilisée pour les produits suivants:

Produit	Substance active	Formulation	Fournisseur	Conditionnement	Autorisé contre	
					Souris	Rats
Selontra	Cholécalciférol (vitamine D3) 0.075 g / 100 g	Granulés	BASF	3 kg	X	X
Klerat Pellets XT	Brodifacoum 0.0024 g / 100 g	Granulés	Syngenta	5 kg	X	X
Storm Ultra Happen	Flocoumafén 0.0025 g / 100 g	4 g d'appât	Leu + Gygax	300 g / 3 kg	X	X
Neosorexa CW	Difenacoum 0.005 g / 100 g	Céréales concassées	Omya	500 g / 2 kg	X	X
Surux Flocons	Brodifacoum 0.005 g / 100 g	Flocons de céréales	Stähler	600 g / 10 kg	X	X
Surux Grains	Brodifacoum 0.005 g / 100 g	Grains de céréales	Stähler	1 kg / 10 kg	X	
Fortissimo Appât pour rats et souris	Brodifacoum 0.004 g / 100 g	Sachets de 10 g	Sintagro	1 kg / 5 kg	X	X
Klean Agro Pat	Difenthialone 0.025 g / 100 g		Stähler	1.5 kg	X	X

Les appâts en vrac ne peuvent être vendus aux utilisateurs non professionnels que dans des sachets. Utiliser les rodenticides avec précaution. Lire l'étiquette et les informations avant toute utilisation.

Possibilités de lutte sans rodenticides

Les produits suivants sont disponibles dans votre LANDI Agro:

	Vorteile	Nachteile	
Piège topcat (dans les champs)	<ul style="list-style-type: none"> • 1 piège-guillotine par trou • Mort instantanée des animaux 	Prix, mais le piège a une longue durée de vie	
Topsnap (habitations et fermes)	<ul style="list-style-type: none"> • Mort instantanée des animaux 	Prix, mais le piège a une longue durée de vie	
Piège à pince (dans les champs)	<ul style="list-style-type: none"> • Facile à utiliser • Faible usure • Prix 	2 pièges pour trous	
Tapette à souris (habitations et fermes)	<ul style="list-style-type: none"> • Bonne efficacité • Prix/qualité 	Les pièges sont parfois emportés par les animaux capturés	
Piège grillagé (habitations et fermes)	<ul style="list-style-type: none"> • Capture les souris vivantes 	Prix et facilité d'utilisation	

Source images: LANDI.ch

Recommandation AGROLINE

Pour la maison et l'étable, les pellets Klerat XT sont bon marché et conviennent parfaitement, car les animaux ne peuvent pas les disperser dans l'étable. Le nouveau produit Selontra® contenant la substance active naturelle cholécalciférol (vitamine D3). L'avantage est que les empoisonnements secondaires d'autres animaux non ciblés peuvent être exclus. Les deux produits sont particulièrement bien acceptés par les souris et les rats (forte appétence). Nous recommandons de changer de substance active chaque année pour éviter l'apparition de résistances.