

## LADY ROSETTA

Stand 11.01.2021

Die Sortenbeurteilung und die Anbauempfehlungen beruhen auf dem aktuellen Stand der Erkenntnisse

| Sortenbeschreibung         |                 | Anfälligkeit                    |               |
|----------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------|
| Verwendung:                | Chips           | Krautfäule/Knollenfäule:        | hoch/mittel   |
| Züchter:                   | C. Meijer B.V.  | Rhizoctonia Pocken/Deformation: | mittel/gering |
| Reife:                     | früh-mittelfrüh | Schorf:                         | gering        |
| Kochtyp:                   | C               | Pulverschorf:                   | gering        |
| Knollen pro Staude:        | 12-16           | Virus Blattroll PLRV:           | mittel        |
| Knollenertrag:             | mittel          | Virus Mosaik PVY:               | mittel-hoch   |
| Stärkegehalt:              | 17-19 %         | Alternaria:                     | mittel        |
| Lagereignung:              | mittel          | Schlagschäden:                  | hoch          |
| Keimruhe:                  | gering          | Empfindlichkeit auf Abkeimen:   | mittel        |
| Kraut bei der Vernichtung: | laubstark       | Metribuzin Empfindlichkeit:     | VA            |

### Sortenspezifische Anbauinformationen

#### Pflanzgutaufbereitung-Vorkeimung

| Kaliber in mm | Pflanzabstand in cm | Pflanzdichte pro ha in Stück |
|---------------|---------------------|------------------------------|
| 32-40         | 22-24               | 60 600-55 600                |
| 40-50         | 26-28               | 51 300-47 600                |

#### Pflanzenschutz

**Knollen Beizung:** Beim Pflanzen.

**Alternaria:** Auf eine konsequente Bekämpfung mit Spezialprodukten kombiniert mit der Krautfäulespritzung achten (z.B. Amistar/Dagonis/Taifen/Difenoconazol Produkten/Flint/Signum).

**Blattläuse:** ÖLN Schadschwelle: Pro Fiederblatt 10 Blattläuse (Movento/Teppeki).

| Krautvernichtung          | Variante ohne Schlegeln                   | Variante mit Schlegeln  |
|---------------------------|---|---|
| 1. Massnahme              | Firebird Plus 2 l/ha                      | Schlegeln   |
| 2. Massnahme              | nach 5-8 Tagen: Spotlight Plus 1 l/ha     | nach 1-3 Tagen: Spotlight Plus 1 l/ha oder Firebird Plus 2 l/ha     |
| 3. Massnahme              | ev. nach 5-8 Tagen: Spotlight Plus 1 l/ha | ev. nach 5-8 Tagen: Spotlight Plus 1 l/ha oder Firebird Plus 2 l/ha |
| ohne Pflanzenschutzmittel | Schlegeln und Abflammen                   |   |

#### Düngung (Nährstoffversorgung bei Bodenversorgungsstufe C)

| Nährstoffe               | Optimum kg/ha   | Bemerkungen   |
|--------------------------|---|---|
| Stickstoff               | 140-160   | Splitten, 2. Gabe 40 kg Stickstoff beim Knollenansatz |
| Phosphor (wasserlöslich) | 80-100  |   |
| Kali (chlorfrei)         | 250-350   |   |
| Magnesium                | 40  |   |
| Spurenelemente           | Spurenelemente über Blattdünger ergänzen (EPSO Microtop, Fertiplus) |   |

#### Wichtige Anbauhinweise

Rotschalig. Erhöhtes Risiko für Schlagschäden.