

Andersonipak



contre les ravageurs

Mode d'emploi

Auxiliaire	Acarien prédateur <i>Amblyseius andersoni</i>
Efficace contre	Les acariens (action partielle contre les rouilles)
Domaine d'utilisation	En serre (aubergines, tomates, concombres, poivrons, courgettes)
Formulation	Adultes
Unité	25 000 (boîte d'épandage) 250 x 250 (sachet)
Dose d'emploi	30–50 organismes par m ²
Période d'application conditions climatiques	Conditions climatiques Températures de 10 ° C déjà actif même des températures de 35–40 ° C il est encore actif, Idéal 20–28 ° C, Nécessite une humidité relative de 60–80 % , une humidité inférieure à 65 % moins d'activité
Mécanisme d'action	Les acariens prédateurs adultes sont de couleur beige et mesurent entre 0,5 et 1 mm. Leur cycle de vie comprend quatre stades : œuf, larve, nymphe et adulte. Les acariens prédateurs piquent leur proie avec leurs pièces buccales et la vident de son contenu.
Application	1. Produits à saupoudrer : Avant d'ouvrir le récipient, tournez-le délicatement et secouez-le pour que les auxiliaires se répartissent uniformément dans le support.

Sachets : Ne pas appuyer sur le contenu !

2. N'ouvrir le récipient que dans la serre.
3. Répartir le contenu uniformément sur les feuilles.
Suspendre les sachets dans la partie supérieure de la culture, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Indications importantes

- En cas de forte infestation, nous recommandons une utilisation supplémentaire de Fitopak (*Phytoseiulus persimilis*).
- Les traitements chimiques, en particulier les insecticides, doivent être pesés avec le plus grand soin pendant l'utilisation des auxiliaires et évités dans la mesure du possible. En cas d'incertitude, veuillez contacter l'équipe AGROLINE.
- Ne pas appliquer les auxiliaires en cas de fort ensoleillement.

Autorisé en Suisse selon la liste des intrants du FiBL pour l'agriculture biologique.