

ARGOLEM



contre les maladies

Mode d'emploi Argolem

Fongicide à base d'argile sulfurée et d'extrait de prêle.

Unité: 25 kg

Mécanisme d'action: Les ions aluminium libérés dans la solution aqueuse inactivent les spores en germination. Par ailleurs, les plantes traitées bénéficient d'une résistance accrue aux attaques fongiques et bactériennes.

Dosage et période d'utilisation

Pour garantir un traitement homogène, appliquer le produit de préférence avec une grande quantité d'eau (> 800 l/ha)

• Arboriculture fruitière

- Tavelure, oïdium des fruits à pépins (effet partiel) et maladie criblée des fruits à noyau: 0,5% (8 kg/ha) Argolem + 0,3% (4,8 kg/ha) Microthiol Spécial Disperss (appliquer Argolem uniquement en association avec du soufre / Microthiol Spécial Disperss). Utilisation préventive dès le débourrement, avant une période pluvieuse. Ajuster les intervalles de pulvérisation en fonction des conditions météorologiques et de la production d'ascospores. Renouveler le dépôt de pulvérisation après 15 - 20 mm de précipitations. Traiter également les nouvelles feuilles non protégées. Argolem peut également être appliqué pendant la floraison. Délai d'attente: 3 semaines.
- Maladies de conservation, pourritures (effet partiel): 0,5% (8 kg/ha), délai d'attente de 3 semaines.
- Feu bactérien (effet partiel): 0,5% (8 kg/ha). 1er traitement entre le stade ballon (E2=59) et le début de la floraison (F=61). Autres traitements: Périodiquement, tous les 5 - 7 jours jusqu'à ce que toutes les fleurs soient ouvertes ou après 20 mm de précipitations, resp. 1 - 2 jours avant la prévision d'une infection (selon le modèle prédictif MaryBlyt).
- Flétrissement bactérien (dessèchement à Pseudomonas) du poirier (effet partiel): 0,5% (8 kg/ha). Utilisation: 1er traitement lorsque 10% des fleurs sont ouvertes (F=61), puis tous les 5 jours jusqu'à la fin de la floraison (H=69).
- Roussissure: Appliqué correctement, le risque de roussissure est faible, selon les tests effectués jusqu'à présent. En cas de roussissure, nous déclinons toute responsabilité.

• Viticulture

- Oïdium et mildiou, rougeot parasitaire (effet partiel): 0,5% + 0,3% de soufre mouillable. 1er traitement en mai, suivi de pulvérisations à 8 - 12 jours d'intervalle, en fonction des précipitations (lessivage) et du développement foliaire. Raccourcir les intervalles de traitement en cas de fortes précipitations, surtout au moment de la floraison. Des dosages élevés peuvent provoquer des brûlures sur les cépages sensibles (Chasselas, Nebbiolo, variétés interspécifiques). En alternant l'usage d'Argolem avec un produit cuivré, 15 - 20 mm de pluie sont nécessaires pour éviter des problèmes de phytotoxicité! Délai d'attente: dernière application au plus tard à la mi-août.

• Houblon

- Mildiou: 0,5%, jusqu'au plus tard à la mi-août. Efficace uniquement à titre préventif contre une infection secondaire.

Bien mélanger Argolem dans des seaux séparés avec de l'eau chaude · heure avant utilisation à l'aide d'un fouet/agitateur à batterie. Remplir la cuve à moitié avec de l'eau. Bien remuer le contenu du seau à nouveau et le

verser dans la cuve en laissant tourner le mélangeur. Remplir la cuve avec la quantité d'eau nécessaire. Attention: Vider la cuve en une seule fois pour éviter le risque de sédimentation.

Miscibilité : Non miscible avec le cuivre, les pyréthrinés, les acides gras et le bicarbonate de potassium

Stockage : A l'abri du gel, au sec, à température ambiante. Ne pas stocker avec des substances explosives, inflammables ou infectieuses. Aucune restriction de transport.

Admis en agriculture biologique en Suisse selon la liste des intrants du FiBL.