

CEPHITOP



contre les ravageurs

Mode d'emploi CephiTop contre les cucujides dans les entrepôts

Unité: 40 microguêpes parasitoïdes/tube; 1 tube suffit pour un espace de 10 à 25 m²

Dose d'application

- 1 tube/pièce de 10 à 25 m²
- Le nombre de livraisons dépend des conditions spécifiques de l'entrepôt et, le cas échéant, de la pression d'infestation de l'année précédente

Mode d'action

Les microguêpes (*Cephalonomia tarsalis*) de 2-3 mm paralysent les larves du cucujide dentelé des grains ou silvain (*Oryzaephilus surinamensis*) et du cucujide des grains oléagineux (*Oryzaephilus mercator*). Le cycle de développement des larves de cucujides est interrompu et celles-ci cessent par conséquent de se nourrir à partir des denrées entreposées. Jusqu'à 2 microguêpes peuvent se développer sur une larve de coléoptère. Les auxiliaires commencent à pondre leurs œufs à partir de 16 °C.

Période d'application

- Mi-avril à fin septembre, selon la température dans l'entrepôt
- Pour déterminer le début du traitement, il est recommandé de surveiller l'activité des coléoptères à l'aide de pièges

Utilisation

Les auxiliaires doivent être lâchés directement après leur réception dans l'entrepôt infesté:

1. Dévisser le couvercle et ouvrir le tube.
2. Secouer légèrement le tube en tenant l'ouverture vers le bas, jusqu'à ce que toutes les microguêpes aient quitté le tube.

Stockage

Les microguêpes parasitoïdes ne peuvent pas être stockées et doivent être utilisées immédiatement après la livraison.