

# PHÉROMONES



## surveillance

### Mode d'emploi Phéromones pour piège delta

Unité: Diffuseur de phéromone par piège (1-2 pièces par saison selon le ravageur)



Diffuseur de phéromone, 1 pièce/saison:

- Sésie du pommier
- Zeuzère du poirier, ver des jeunes fruits
- Tordeuse du pois
- Noctuelle potagère, sésie du groseillier, petite tordeuse des fruits, teigne des crucifères
- Teigne du poireau, tordeuse de la pelure
- Petite mineuse du pêcher

Diffuseur de phéromone, 2 pièces/saison:

- Carpocapse, tordeuse de la pelure du pommier
- Noctuelle de la tomate
- Tordeuses de la vigne: Cochylis et Eudémis
- Mineuse cerclée
- Noctuelle Gamma
- Mineuse du marronnier
- Noctuelle du chou
- Punaise diabolique
- Tordeuse orientale du pêcher
- carpocapse des prunes
- Noctuelle des moissons
- Noctuelle ypsilon

**Mode d'action:** Le diffuseur de phéromone émet un appât volatile qui attire les papillons mâles de l'espèce respective. Ceux-ci adhèrent à la surface engluée du piège et fournissent ainsi des informations sur le degré d'infestation.

#### Utilisation

1. Mettre une paire de gants, sortir le diffuseur de phéromone du sachet. Les phéromones sont en général conditionnées sous forme de capsules.
  2. Placer une capsule directement sur le fond englué du piège.
  3. Assembler et monter le piège delta conformément au mode d'emploi séparé.
- Utilisation du piège: Juste avant le début prévu du vol du ravageur. Sous abris, placer le piège à proximité immédiate des plantes à protéger.
  - Suspendre le piège à l'aide d'une cordelette dans la couronne de l'arbre à une hauteur de 1,5 à 2 m. Dans les serres, suspendre le piège directement au-dessus de la végétation et adapter sa hauteur en fonction de la croissance des plantes.
  - Remplacer le fond englué après 4 à 6 semaines (selon les conditions météorologiques). Dès qu'il est saturé d'insectes, le fond englué doit être remplacé, sinon les papillons ne peuvent plus y adhérer.
  - Conservation: au réfrigérateur (voir étiquette)