

ENPAK (à saupoudrer)



contre les ravageurs

Mode d'emploi Enpak:

Microguêpes parasitoïdes contre les mouches blanches (aleurodes) en serre

Unités: 3000 ou 15000 petites microguêpes parasitoïdes de l'espèce *Encarsia formosa* contre les mouches blanches. Conditionnées dans des flacons en PET sous forme de nymphes dispersées dans de la sciure de bois.

Dose d'application: 1 - 20 organismes / m². Utilisation dès l'apparition des premières larves.

Recommandation: 4 - 5 organismes / m² au départ.

Cultures: Cultures maraîchères et ornementales en général, en serre.

Mode d'action: Les femelles d'*Encarsia formosa* pondent leurs œufs dans les larves de mouches blanches. Après 10 jours, celles-ci deviennent noires. Quelques jours plus tard, une nouvelle microguêpe y éclot.

Les 3^e et 4^e stades larvaires sont parasités. Les *Encarsia formosa* adultes se nourrissent de miellat, ainsi que de jeunes stades larvaires de la mouche blanche («hostfeeding»).

Période d'utilisation: Nécessite des conditions de jours longs avec au moins 10 h de lumière par jour.

Conditions climatiques: Au moins 18 °C pendant 6 h par jour. Peu d'activité en dessous de 18 °C. La température optimale est 20 - 27 °C. Nécessite une humidité relative de 50 - 70 %.

Utilisation:

1. N'ouvrir l'emballage qu'une fois dans la serre.
2. Épandre le contenu de l'emballage directement sur les plantes à protéger. Idéalement sur des feuilles à l'ombre ou dans les boîtes en carton à suspendre. Appliquer généralement dans la moitié inférieure des plantes. Répartir le contenu aussi uniformément que possible, en privilégiant les zones les plus infestées. Pour faciliter le lâcher, AGROLINE propose des boîtes en carton à suspendre (remplir sur une hauteur de 2 cm maximum).
3. Contrôle d'efficacité: Env. 14 jours après le premier lâcher, les nymphes parasitées prennent une couleur noire. Environ 80% des larves de mouches blanches devraient être parasitées.

Indications importantes:

- Les pièges chromatiques jaunes permettent de surveiller le développement des mouches blanches.
- L'usage de produits phytosanitaires doit être évalué avec discernement lors de l'utilisation des auxiliaires et évité autant que possible. Si vous êtes incertain, veuillez contacter l'équipe AGROLINE.
- Ne pas lâcher les auxiliaires en cas de fort ensoleillement.

Stockage: Le produit doit être appliqué dès réception. Il peut être stocké pendant 24 heures à 12 °C.

Admis en agriculture biologique en Suisse selon la liste des intrants du FiBL.