

# LARIOTOP



## contre les ravageurs

### Mode d'emploi LarioTop contre les larves de coléoptères dans les entrepôts

Unité: 40 microguêpes parasitoïdes/tube

#### Dose d'application

- 1 tube/pièce de 5 m<sup>2</sup>
- Le nombre de livraisons dépend des conditions spécifiques de l'entrepôt et, le cas échéant, de la pression d'infestation de l'année précédente

#### Mode d'action

Les microguêpes *Lariophagus distinguendus* sont des parasitoïdes de 2-3 mm, antagonistes naturels des charançons du blé (*Sitophilus granarius*) et des vrillettes du pain (*Stegobium paniceum*). La microguêpe perce le grain avec sa tarière de ponte et pique la larve de coléoptère pour l'anesthésier. Ensuite, elle pond un œuf à côté de la larve du coléoptère. De cet œuf éclot une larve de microguêpe, qui pendant sa croissance, se nourrit de la larve du coléoptère et la rend ainsi inoffensive. Après la nymphose, la microguêpe adulte perce un trou dans le grain et le quitte pour partir à la recherche d'autres ravageurs.

#### Période d'application

- Mi-avril à fin septembre, selon la température dans l'entrepôt
- Pour déterminer le début du traitement, il est recommandé de surveiller l'activité des coléoptères à l'aide de pièges

#### Utilisation

Les auxiliaires doivent être lâchés directement après leur réception dans l'entrepôt infesté:

1. Dévisser le couvercle et ouvrir le tube.
2. Secouer légèrement le tube en tenant l'ouverture vers le bas, jusqu'à ce que toutes les microguêpes aient quitté le tube.

#### Stockage

Les microguêpes parasitoïdes ne peuvent pas être stockées et doivent être utilisées immédiatement après la livraison.