

NEMAPLUS



contre les ravageurs

Mode d'emploi Nemaplus contre la larve de la sciaride 1000 m²

Unité: 500 millions de nématodes (*Steinernema feltiae*)

Mécanisme d'action: Les nématodes recherchent activement les larves des ravageurs et les infectent. Les auxiliaires se reproduisent dans les larves et quittent les larves mortes à la recherche de nouvelles larves.

Période d'application: Toute l'année

Application

Température du sol: supérieure à 8 °C au moins quelques heures par jour

Humidité du sol: Le sol doit être humide pendant l'application et maintenu humide pendant 3 à 4 semaines après l'application. Épandre avec 1 litre d'eau/m². Application le soir ou par temps couvert. Une forte exposition aux rayons UV nuit aux nématodes.

- Utiliser tout le contenu du sachet en une seule fois.
- Pulvériser toute la bouillie préparée.
- Enlever tous les filtres et les tamis du pulvérisateur.
- La pression ne devrait pas dépasser 5 bars.
- Diamètre minimal de la buse: 0,8 mm.

Pulvérisateur

- Bien rincer le pulvérisateur avant utilisation.
- Remplir la cuve avec de l'eau et mettre le mélangeur en marche.
- Verser le nombre de sachets nécessaire dans l'eau par le tamis.
- Pendant l'application, la bouillie doit être continuellement en mouvement afin d'éviter que les nématodes ne se déposent au fond de la cuve.

Systèmes d'irrigation

- Application possible avec les systèmes d'irrigation au goutte à goutte, tuyaux perforés et charriots d'arrosage.
- Diluer la poudre dans l'eau et verser la solution dans la cuve d'aspiration. Remuer constamment la solution ou y ajouter 0,4 % de méthylcellulose (colle pour papier peint), pour maintenir les nématodes en suspension.
- Rincer ensuite les conduites avec de l'eau.

Immersion

- Diluer 500 millions de nématodes dans 800 l d'eau. Bien remuer.
- Remuer constamment la solution en y injectant de l'air comprimé ou y ajouter 0,4 % de méthylcellulose (colle pour papier peint), pour maintenir les nématodes en suspension.
- 800 l de solution suffisent pour traiter env. 4000 plantes avec une motte de la taille du poing.

Traitement par arrosage des plantes en conteneurs

Diluer 500 millions de nématodes dans 1000 l d'eau et répartir la solution uniformément dans les pots et conteneurs. Doses d'utilisation:

Ø des pots cm	Volume des pots litre(s)	Solution par pot ml	Pots par sachet
10	0.5	10	100 000
12	0.8	16	62 500
14	1.5	30	33 333
	3	60	16 667
	5	100	10 000

Stockage: Les nématodes se conservent dans l'emballage fermé jusqu'à la date indiquée à une température entre 2 et 8 °C.