

NEMASTAR



contre les ravageurs

Mode d'emploi

Nemastar contre les vers gris, les courtilières et les tipules 20 m²

Unité: 10 millions de nématodes (*Steinernema carpocapsae*)

Mécanisme d'action: Les nématodes recherchent activement les larves des ravageurs et les infectent. Les auxiliaires se reproduisent dans les larves et quittent les larves mortes à la recherche de nouvelles larves.

Période d'application

Vers gris: juin – septembre, **Courtilières:** avril – juillet, **Tipules:** septembre – octobre

Utilisation



1. Dissoudre tout le contenu du paquet dans 2 litres d'eau.
2. Bien agiter.
3. Diluer 1 litre de cette solution de nématodes avec 9 litres d'eau du robinet.
4. Répartir la solution diluée avec un arrosoir sur 10 m².
5. Bien mélanger la solution de nématodes obtenu après l'étape 1 et répéter les étapes 3 et 4 jusqu'à ce que la solution de nématodes soit épuisée.
6. Arroser la zone traitée.

Indications

- Température du sol: supérieure à 12 °C au moins quelques heures par jour.
- Humidité du sol: humide au moment d'appliquer, maintenir le sol humide pendant 2 semaines après l'application. Épandre avec 1 litre d'eau/m² au minimum. Application le soir ou par temps couvert. Éviter l'exposition au soleil. Les UV nuisent aux nématodes.

Stockage: Les nématodes se conservent dans l'emballage fermé jusqu'à la date indiquée à une température entre 4 et 12 °C.

Application possible avec un pulvérisateur comme Nema-Sprayer: www.bioprotect.ch