

Mode d'emploi Phéromones pour piège à entonnoir

Unité: Diffuseur de phéromone par piège (1-2 pièces par saison selon le ravageur)



Diffuseur de phéromone avec 1 pièce/saison:

- Sésie du pommier
- Pyrale du buis
- Chenille processionnaire du chêne, tordeuse du pois
- Noctuelle potagère, sésie du groseillier
- Teigne du poireau, petite tordeuse des fruits
- Chenille processionnaire du pin

Diffuseur de phéromone avec 2 pièces/saison:

- Carpopapse, tordeuse de la pelure du pommier
- Noctuelle de la tomate, tordeuse de la vigne (Eudémis)
- Tordeuse du pois, tordeuse de la vigne (Cochylis)
- Noctuelle gamma, noctuelle du chou, teigne des crucifères
- Tordeuse orientale du pêcher, noctuelle des moissons
- Cossus gâte-bois, noctuelle ypsilon

Mode d'action:

Le diffuseur de phéromone émet un appât volatile qui attire les papillons mâles de l'espèce respective dans le piège, dont ils ne peuvent pas s'échapper. La quantité de papillons dans le piège donne une indication sur la pression d'infestation.

Utilisation:

1. Remplir le piège à entonnoir avec 1/3 d'eau additionnée de quelques gouttes de liquide vaisselle. Placer l'entonnoir sur le récipient collecteur et le fixer en le faisant tourner latéralement.
 2. Déposer la capsule de phéromone dans le panier intégré au couvercle (voir illustration)
 3. Pour suspendre le piège, introduire le fil de suspension dans les trous du couvercle et bien enrouler les extrémités.
- Utilisation du piège: Juste avant le début prévu du vol du ravageur.
 - Suspendre le piège à proximité des cultures. En cas de besoin, remplir à nouveau le piège avec de l'eau additionnée de quelques gouttes de liquide vaisselle.
 - Tenir le diffuseur de phéromone hors de portée des enfants et des animaux. Le diffuseur de phéromone ne doit pas entrer en contact avec la peau.
 - Conservation: au réfrigérateur (voir étiquette)