

WALNUSSFRUCHTFLIEGEN- FALLE



Monitoring

Gebrauchsanleitung Walnussfruchtfliegenfalle

Die Walnussfruchtfliegenfalle lockt Walnussfruchtfliegen mittels der gelben Farbe an. Die Schädlinge bleiben auf der Klebefläche haften und geben so Aufschluss über einen Befall.

Einheit

8 Fallen, 8 Befestigungsdrähte, 1 Paar Handschuhe

Aufwandmenge



8 Fallen/50 Bäume

Anwendungsperiode

Ende Juni-Ende August

Montage

1. Falle auffalten, damit die Klebefläche gegen aussen schaut.
2. Rundlaschen durchdrücken und einhängen.
3. Draht durch die beiden Löcher ziehen.
4. Nah am Ast und nicht von Blättern verdeckt am Baum fixieren.



Informationen zur Walnussfruchtfliege

Die Fliegen schlüpfen ab Ende Juni bis Ende August. Die Weibchen legen ca. 1 Woche später insgesamt 300-400 Eier in Gruppen von ca. 15 Stück unter die Fruchtschale der sich entwickelnden Früchte ab. Die Eiablage kann bis zu 6 Wochen dauern. Die Larven schlüpfen nach ca. 1 Woche und ernähren sich vom Fruchtfleisch der äusseren Fruchtwand. Nach 3 - 5 Wochen lassen sich die Larven alleine oder mit der Frucht zu Boden fallen und verpuppen sich in der Erde. Die meisten Fliegen schlüpfen im darauffolgenden Jahr, ein Teil erst 1- 2 Jahre später.

Schaden

Erste Anzeichen eines Befalls geben kleine schwarze Punkte auf der Frucht, verursacht durch den Einstich der Fliege bei der Eiablage. Durch die Frasstätigkeit der Larven werden die Früchte weich, feucht und schwarz. Nicht zu verwechseln mit den harten, trockenen Flecken, die durch Krankheiten verursacht werden. Die Fruchtschale bleibt normalerweise ganz, das Fruchtfleisch hingegen zerfällt und verschmutzt die Nusschale. Der Nusskern wird nur in einem frühen Befall geschädigt.