Salix

Gebrauchsanleitung/Mode d'emploi

Wirkstoff
Weidenrindenextrakt

Ingrédient actif
Extrait d'écorce de saule

Wirkt gegen
Schorf, Kräuselkrankheit, Echtem und Falschem Mehltau

Efficace contre
Les maladies fongiques en viticulture et en arboriculture fruitière.

Einsatzbereich
Obst- und Weinbau

Domaines d'application
Viticulture et arboriculture fruitière

Einheit
10 l Bag-in-Box (Beutel im Karton), SL (lösliches Konzentrat)

Unité
Bag-in-box de 10 l (sachet de 10 l en carton), SL (concentré soluble)

Lagerung
Die Haltbarkeit beläuft sich auf 18 Monate ab Herstellungsdatum bei sachgerechtem Gebrauch und sachgerechter Lagerung. Bei Lagerung oder Anwendung bei über 20 °C kann es zu einem leichten Austreten von Kohlensäure kommen.

Stockage
La durée de conservation est de 18 mois à compter de la date de fabrication, à condition que le produit soit utilisé et stocké correctement. Lors du stockage ou de l'utilisation à des températures supérieures à 20 °C, il peut se produire un léger dégagement de dioxyde de carbone.

Wirkmechanismus
Weiden und besonders Korbweidenrinden sind reich an bioaktiven Polyphenolen und Salicinderivaten (Salizylsäure). Das Pflanzenextrakt stimuliert die internen Abwehrkräfte und besitzt präventive und keimhemmende Wirkungen gegen Schadpilze. Die immunstimulierenden Eigenschaften beruhen auf dem Wirkstoff Salizylsäure, ein Pflanzenhormon, das die Abwehrmechanismen lokal und systemisch gegen Pathogene aktiviert. Salix ist ein natürliches Pflanzenhilfsmittel mit Teilwirkung und ermöglicht die Reduktion von Fungiziden, ersetzt diese aber nicht.

Mode d'action
Les saules, et en particulier l'écorce du saule osier, sont riches en polyphénols bioactifs et en dérivés de la salicine (acide salicylique). Cet extrait de plante stimule les défenses immunitaires et a un effet prophylactique et antigerminatif contre les champignons nuisibles. Les propriétés immunostimulantes reposent sur le principe actif de l'acide salicylique, une hormone végétale qui active les mécanismes de défense contre les agents pathogènes, au niveau local et systémique. Adjuvant pour les plantes naturel avec effet partiel, permet de réduire l'usage des fongicides, mais ne les remplace pas.

Anwendung
- **Äpfel:** 0,75 % (7,5l/ha) gegen Schorf und Echten Mehltau, Stadium BBCH53 bis BBCH67. 2–6 Behandlungen. Höchstdosis 2222 g a.i/ha
- **Pfirsiche:** 0,75 % (7,5l/ha) gegen Kräuselkrankheit, Stadium BBCH10 bis BBCH57. 2–6 Behandlungen. Höchstdosis 2222 g a.i/ha
- **Weinreben:** 0,31 % (5l/ha) gegen Echten und Falschen Mehltau, Stadium D bis H (BBCH10 bis BBCH57). 2–6 Behandlungen. Höchstdosis 667 g a.i/ha

Im Freien oder in gut belüfteten Räumen öffnen und verwenden. Tank zu 2/3 mit Wasser füllen, danach gewünschte Menge bei laufendem Rührwerk hinzufügen. Ggf. Mischungspartner hinzufügen und anschliessend Tank auffüllen. Mischbrühe sollte sofort verwendet werden.

Utilisation
- **Pommiers:** 0,75 % (7,5l/ha) contre la tavelure et l'oïdium, stades BBCH53 à BBCH67. 2 à 6 traitements. Dose maximale : 2222 g a.i/ha
- **Pêchers:** 0,75 % (7,5l/ha) contre la cloque du pêcher, stades BBCH10 à BBCH57. 2 à 6 traitements. Dose maximale : 2222 g a.i/ha
- **Vigne:** 0,31 % (5l/ha) contre l'oïdium et le mildiou, stade D à H (BBCH10 à BBCH57). 2 à 6 traitements. Dose maximale : 667 g a.i/ha

Ouvrir le contenant en plein air ou dans une pièce bien ventilée avant d'utiliser. Remplir 2/3 du volume de la cuve avec de l'eau, laisser tourner le mélangeur et verser la quantité de produit souhaitée. Ajouter si nécessaire les produits partenaires et achever de remplir la cuve du pulvérisateur. La solution doit être utilisée immédiatement.

Mischbarkeit
Das Produkt ist mit allen Pflanzenschutzmitteln mischbar. Auflagen der Mischpartner sollten beachtet werden.

Miscibilité
Le produit est miscible avec tous les produits phytosanitaires. Respecter les instructions d'emploi des produits à associer.

Gemäss FiBL-Betriebsmittelliste für den biologischen Landbau in der Schweiz zugelassen. Pflanzenhilfsmittel aus Grundstoffen (zugelassen ohne Wirkungs- und Pflanzenverträglichkeitsnachweis).

Admis en agriculture biologique en Suisse selon la liste des intrants du FiBL. Adjuvant pour les plantes consistant en substances de base (homologué sans preuve d'efficacité ni de phytotoxicité pour les plantes).

AGROLINE fenaco Genossenschaft Nordring 4 CH-4147 Aesch
T +41 58 434 32 82 agroline.ch