

RAMPASTOP® P



gegen Schädlinge

Gebrauchsanleitung Rampastop® P

Einheit:

1 oder 5 Liter

Wirkmechanismus:

Rampastop® P ist eine Paste, die auf den Stamm von Bäumen aufgetragen wird. Diese mechanische Barriere (Leimschranke) verhindert, dass kriechende Insekten am Stamm in die Baumkrone gelangen können. Der Einsatz von Insektiziden kann somit verringert oder sogar vermieden werden. Nützlinge, wie z.B. Marienkäfer, werden nicht mehr durch Ameisen vertrieben.

Anwendung:

- In Steinobst: anzuwenden ab April. Nach 8 - 12 Wochen sollte die Behandlung wiederholt werden.
- Bei der Anwendung an jungen Bäumen (< 2 Jahre) können Nekrosen am Stamm auftreten. Daher vor Aufbringen der Paste an der gewünschten Stelle, den Stamm mit einem Schutzfilm versehen. Dieser sollte undurchlässig sein und nach der Anwendungsperiode entfernt werden.
- Rampastop® Leimschranke nicht auf die Veredelungsstelle auftragen. Im Folgejahr die Anwendung auf der gleichen Stelle vermeiden. Zum Schutz von Vögeln nicht auf horizontale Äste/Stammteile aufbringen.
- Beachten Sie auch die Anwendungs-Empfehlung auf der Packung

Bitte beachten:

Leimgürtel von 1 - 3 cm Breite auf trockener Fläche auf den Stamm aufbringen. Dabei sollte der Leim sorgfältig aufgebracht werden, es sollten keine Fehlstellen oder mögliche Durchgänge unter dem Leimring entstehen. Vor allem bei älteren Bäumen muss die Paste auch in die Spalten der Rinde eingearbeitet werden. Zum Boden einen Abstand von 30 - 40 cm einhalten, alternativ kann die Paste direkt unter der Astverzweigung angebracht werden. 4 - 5 l sind ausreichend für 100 Bäume (Durchmesser 15 cm)

Lagerung:

Frostfrei lagern und transportieren. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Getrennt von Lebensmitteln, Getränken, Futtermitteln und Genussmitteln aufbewahren. Nicht in der Nähe von Arzneimitteln oder Kosmetika lagern. Produkt an einem kühlen, gut belüfteten Ort im Originalbehälter aufbewahren. Vor übermäßiger Hitze und Kälte und direkter Sonneneinstrahlung schützen.