


Protection des denrées entreposées avec des auxiliaires

Mode d'action des auxiliaires



Bracotop
Les braconides cherchent activement les larves de mites alimentaires pour y déposer leurs œufs.


EVA-Tricho
Les trichogrammes éclosent et quittent le diffuseur en carton pour parasiter les œufs des mites.

D'autres braconides se développent à partir de ces larves. Une fois éclos, ils recherchent de nouvelles larves de mites à parasiter.

Ils se développent à l'intérieur des œufs de mites, éclosent et recherchent de nouveaux œufs à parasiter.

Surveillance

- Piège à phéromone**
- Mites des denrées alimentaires: mite des fruits secs et pyrale de la farine
 - CHF 7.10*/pièce, phéromone incluse/100 m²



Nous vous conseillons volontiers pour établir un programme de surveillance et de lutte adapté à la configuration de vos locaux.

Contactez-nous!
058 434 32 82
bioprotect@fenaco.com
www.bioprotect.ch

Nous proposons également un système de surveillance numérique - demandez-nous conseil!



printed in switzerland

Protection des denrées entreposées avec des auxiliaires



AGROLINE Bioprotect fenaco société coopérative
Nordring 4 4147 Aesch Tél. 058 434 32 82
bioprotect@fenaco.com www.bioprotect.ch

AGROLINE Bioprotect
fenaco Genossenschaft
Nordring 4
4147 Aesch

AGROLINE Service & Bioprotect

A nicht frankieren
ne pas affranchir
non affrancare

50547972
223447
DIE POST

GAS/ECR/ICR

Ravageur



Mite alimentaire adulte

Les **mites des denrées alimentaires** hivernent sous forme de larves et se nymphosent à partir de fin mars, selon la température. Peu après, les premiers papillons adultes se déplacent en volant. Les papillons femelles pondent leurs œufs à la surface ou à l'intérieur des marchandises entreposées.

Les larves se développent en se nourrissant des denrées stockées et se nymphosent avant de former une nouvelle génération de papillons.

Si rien n'est entrepris dans la marchandise entreposée ou dans les cellules des silos, les filaments de soie tissés par les larves peuvent former une sorte de couvercle sous lequel s'accumule l'humidité. Le développement de champignons et les attaques d'acariens sont ainsi favorisés. Les larves et les chrysalides dans les sacs de fourrage ne sont pas très appétissantes et irritent les clients.



Larve de mite alimentaire

Auxiliaires

Les **trichogrammes** (EVA-Tricho) et les **braconides** (Bracotop) sont les ennemis naturels des mites des denrées alimentaires. Ces microguêpes parasitent les différents stades de développement des mites, de sorte que les ravageurs ne peuvent plus se développer.

La condition préalable à l'utilisation efficace des auxiliaires est une surveillance précoce dès la fin du mois de mars (voir au verso) et des conditions d'hygiène strictes.

EVA-TRICHO

- *Trichogramma evanescens*
- CHF 280.-*/100 m², 14 livraisons de 10 unités

Échelle de taille: *Trichogramma evanescens* sur une tête d'allumette

BRACOTOP

- *Bracon hebetor*
- CHF 196.-*/50 m², 14 livraisons de 2 unités

*Bracon hebetor* sur une larve de mite alimentaire

Carte de commande pour la protection des denrées entreposées

Vos coordonnées

LANDI / autre entrepôt / moulin

Nom / prénom

Rue

NPA / Lieu

Téléphone

E-mail

Date, signature

Produit

EVA-Tricho (14 livraisons)

Bracotop (14 livraisons)

Piège à phéromone

Quantité par livraison

► Surveillance à partir de fin mars avec 1 piège à phéromone/100 m²

► EVA-Tricho: 10 unités/100 m²

► Bracotop: 1 à 2 unités/50 m²

► Bracotop: 1 unité/cellule de silo

Veuillez m'appeler pour une consultation.