

Die Sortenbeurteilung und die Anbauempfehlungen beruhen auf dem aktuellen Stand der Erkenntnisse

| Sortenbeschreibung         |                              | Anfälligkeit                    |                         |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Verwendung:                | Speisesorte<br>mehligkochend | Krautfäule/Knollenfäule:        | mitte/mittel            |
| Züchter:                   | ZPC                          | Rhizoctonia Pocken/Deformation: | gering/gering           |
| Reife:                     | mittelfrüh-mittelspät        | Schorf:                         | hoch                    |
| Kochtyp:                   | B-C                          | Pulverschorf:                   | gering                  |
| Knollen pro Staude:        | 10-14                        | Virus Blattroll PLRV:           | hoch                    |
| Knollenertrag:             | hoch                         | Virus Mosaik PVY:               | mittel-hoch             |
| Stärkegehalt:              | 13-15%                       | Alternaria:                     | gering-mittel           |
| Lagereignung:              | mittel                       | Schlagschäden:                  | mittel                  |
| Keimruhe:                  | mittel                       | Empfindlichkeit auf Abkeimen:   | gering                  |
| Kraut bei der Vernichtung: | laubstark                    | Metribuzin Empfindlichkeit:     | NA max. 350 g Wirkstoff |

### Sortenspezifische Anbauinformationen

#### Pflanzgutaufbereitung-Vorkeimung

Wärmeschock bis Keime sichtbar.

| Kaliber in mm | Pflanzenabstand in cm | Pflanzdichte pro ha in Stück |
|---------------|-----------------------|------------------------------|
| 32-35         | 21-24                 | 63 500-55 600                |
| 35-50         | 26-28                 | 51 300-47 600                |

#### Pflanzenschutz

**Knollen Beizung:** Beim Pflanzen.

**Alternaria:**

**Blattläuse:** ÖLN Schadschwelle: Pro Fiederblatt 10 Blattläuse (Movento/Teppeki).

| Krautvernichtung          | Variante ohne Schlegeln                     | Variante mit Schlegeln  |
|---------------------------|---|---|
| 1. Massnahme              | Firebird Plus 2 l/ha                        | Schlegeln   |
| 2. Massnahme              | nach 5-8 Tagen: Spotlight Plus 1 l/ha       | nach 1-3 Tagen: Spotlight Plus 1 l/ha oder Firebird Plus 2 l/ha       |
| 3. Massnahme              | evtl. nach 5-8 Tagen: Spotlight Plus 1 l/ha | evtl. nach 5-8 Tagen: Spotlight Plus 1 l/ha oder Firebird Plus 2 l/ha |
| ohne Pflanzenschutzmittel | Schlegeln und Abflammen                     |   |

#### Düngung (Nährstoffversorgung bei Bodenversorgungsstufe C)

| Nährstoffe               | Optimum kg/ha   | Bemerkungen                                |
|--------------------------|---|--|
| Stickstoff               | 120-140   |  |
| Phosphor (wasserlöslich) | 80-100  | Patastar Plus verbessert den Knollenansatz |
| Kali (chlorfrei)         | 250-350   |  |
| Magnesium                | 40  |  |
| Spurenelemente           | Spurenelemente über Blattdünger ergänzen (EPSO Microtop, Fertiplus) |  |

#### Wichtige Anbauhinweise

Rotschalig.